

## Leaflet Details

### CIR-230573/2022-Thiamethoxam (WG) (442)-1199 Thiamethoxam 25% WG ( Insecticide)

Thiamethoxam 25 % WG is broad spectrum systemic insecticide having quick stomach and contact action and is recommended for its use to control Stem Borer, Gall Midge, Leaf Folder, Brown Plant Hopper (BHP), while Backed Plant Hopper (WBPH) Green Leaf Hopper (GLH) , Thrips, in rice; jassids, aphids and whiteflies in cotton; hoppers in mango; aphids in Wheat; aphids in Mustard; Whiteflies in Tomato; Whiteflies, Jassids in Brinjal; mosquito bug in Tea, aphids in Potato, Psylla in citrus, aphid in Cumin, soil drench in Rice, Aphid in Cumin and GLH thrips , shorl maggat in Rice (Nursary) . It contains 250g Thiamethoxam as an active ingredient in a kg of the product (w/w).

#### Recommendation

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (days)	Re-entry after each Application (In Hours)
		AI (gm)	Formulation (gm)			
Brinjal	Whiteflies, Jassids	50	200	500	3	
	Whiteflies, Jassids	50	200	500	3	
Citrus	Psylla	25	100	1000	20	
	Psylla (Diaphornia citri)	25	100	1000	20	
Cotton	Jassids, Aphids	25	100	500-750	21	
	Jassids, Aphids	25	100	500-750	21	
	(Apply first spray at 25-30 DAS or at the time of first pest appearance and repeat 2-3 sprays at 15 days interval depending on the pest intensity)					
	White flies	50	200	500-750	21	
	White flies	50	200	500-750	21	
Cumin	Aphid	25	100	500	15	
	Mahu	25	100	500	15	
Foliar application	(Apply first spray during initial pest appearance and repeat 1-2 sprays at 10-15 days interval depending on the level of pest intensity)					
Foliar-applicatoion	(Apply first spray during initial pest appearance and repeat 2-3 sprays at 10-15 days interval depending on the level of pest intensity)					
	(Apply first spray during initial pest appearance and repeat 2-3 sprays at 10-15 days interval depending on the level of pest intensity)					
Mango	Hoppers	25	100	1000	30	

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (days)	Re-entry after each Application (In Hours)
		AI (gm)	Formulation (gm)			
	Hoppers	25	100	1000	30	
	(Apply first spray during initial pest appearance and repeat one or two sprays at 15 days interval depending on the level of pest intensity)					
	Hoppers	25	100	1000	30	
Mustard	Aphid	12.5-25.0	50-100	500-1000	21	
	Aphid	12.5-25.0	50-100	500-1000	21	
	Rapeseed(Apply first spray during initial pest appearance and repeat one or two sprays at 15 days interval depending on the level of pest intensity)					
Okra	Jassids, Aphids	25	100	500-1000	5	
	(Apply first spray during initial pest appearance and repeat one or two sprays at 15 days interval depending on the pest intensity)					
	Jassids, Aphids	25	100	500-1000	5	
	Jassid, Aphid, Thrips White flies	25	100	500-1000	5	
Potato	Aphids, (Myzus persicae)	25	100	500	77	
	Aphids, (Myzus persicae)					
	Aphids, (Myzus persicae)	25 (foliar spray) 50 (Soil drench)	100 (foliar spray) 200 (Soil drench)	500	77	
Rice	Stem borer, Gall Midge, Leaf Folder, Brown Plant Hopper (BPH), White backed, Brown Plant Hopper (BPH) White backed, Plant Hopper (WBPH), Green leafhopper, Thrips		100	500-750	14	
	Leaf Folder					
	Brown Plant Hopper (BPH), White backed					
	the control of late rice pests such as GLH, BPH, WBPH etc.)					
	Stem Borer, Gall Midge and the other spray at the booting leaf stage (@ 50 to 55 DAT) for					
	Stem borer, Gall Midge, Leaf Folder, Brown Plant Hopper (BPH), White backed Plant Hopper (WBPH), Green leafhopper, Thrips	25	100	500-750	14	
	Plant Hopper (WBPH), Green leafhopper, Thrips					

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (days)	Re-entry after each Application (In Hours)
		AI (gm)	Formulation (gm)			
	(One spray at 25-30 DAT in the early stage of crop for control of early rice pests such as					
Rice (Nursery)	Whort maggot	-	-	-	-	
	Whort maggot	500	2000	250ml/gm	86	
Rice (Soildreneh)	GLF thrips	-	-		-	
Soil -drench	Aphids	50	200	400-500	77	
	(Apply root zone before appearance of pest as soil drench,, once during the crop season)					
Tea	Mosquito bug, Helopeltis theivora	25	100	400-500	7	
	Mosquito bug (Helopeltis theivora)	25	100	400-500	7	
	(Apply first spray during initial pest appearance and repeat 2-3 sprays at 15-21 days interval depending on the level of pest intensity)					
Tomato	Whiteflies	50	200	500	5	
	Whiteflies	50	200	500	5	
Tomato (soil drenching)	White flies	100	400	500	5	
Wheat	Aphids	12.5	50	500	21	
	Aphids	12.5	50	500	21	
	(Apply first spray during initial pest appearance and repeat one or two sprays at 15 days interval depending on the level of pest intensity)					

### **Direction Of Use**

Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crop with suitable sprayer. P.P. Equipment:- Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack sprayer, Compression knapsack battery sprayer, Battery operated kpower sprayer and ASPEE-HTP power sprayer..

### **Time of Application**

1. Mango: Hoppers (Apply first spray during initial pest appearance and repeat one or two sprays at 15 days interval depending on the level of pest intensity) 2. Potato: Foliar-application- Apply first spray during initial pest appearance and repeat 2-3 sprays at 10-15 days interval depending on the level of pest intensity. Soil drench- Apply root zone before appearance of pest as soil drench, once during the crop season. 3. Cotton: Apply first spray at 25-30 DAS or at the time of first pest appearance and repeat 2-3 sprays at 15 days interval depending on the pest intensity. 4. Wheat: Apply first spray during initial pest appearance and repeat one or two sprays at 15 days interval depending on the level of pest intensity. 5. Tea: Apply first spray during initial pest appearance and repeat 2-3 sprays at 15-21 days interval depending on the level of

pest intensity. 6. Tomato: Apply first spray during initial pest appearance and repeat 2-3 sprays at 10-15 days interval depending on the level of pest intensity. Soil drench: Apply root zone before appearance of pest as soil drench, once during the crop season. 7. Rice: One spray at 25-30 DAT in the early stage of crop for control of early rice pests such as Stem Borer, Gall Midge and the other spray at the booting leaf stage (@ 50 to 55 DAT) for the control of late rice pests such as GLH,BPH,WBPH etc. 8. Brinjal: Apply first spray during initial pest appearance and repeat 2-3 sprays at 10-15 days interval depending on the level of pest intensity. 9. Okra: Apply first spray during initial pest appearance and repeat one or two sprays at 15 days interval depending on the pest intensity. 10. Mustard: Apply first spray during initial pest appearance and repeat one or two sprays at 15 days interval depending on the level of pest intensity. 11. Citrus: Apply first spray during initial pest appearance and repeat 2-3 sprays at 15-21 days interval depending on the level of pest intensity.

### **Precautions**

1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

### **Symptoms Of Poisoning**

Decrease spontaneous movement, tonic convulsion, ptosis may occur.

### **First Aid**

1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

### **Phytotoxicity**

### **Antidote**

No specific antidote is known. Treat symptomatically.

### **Disposal Of Used Container**

1. Packages or surplus materials and washing form machines and containers should be disposed off in a safe manner as to prevent environment and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse. 3. packages shall be broken and buried away from habitation.

### **Storage Conditions**

1. The package containing the insecticide should be stored in original containers in separate rooms or premises away from rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

### **Chemical Composition**

S.No	Ingredient	Description	Weight
1	Thiamethoxam a.i.		25.00 % w/w
2	Dispersing Agent -sodium Lignosulphate		5.00 % w/w
3	Wetting Agent Sodium Lauryl Sulphate		3.75 % w/w
4	Plasticiser- Butylated polyvinyl pyrrolidone		1.25 % w/w
5	Carrier Diatomaceous earth		5.00 % w/w

6	Binder corn starch		QS % w/w
		Total	100 % w/w

**Manufactured By**

M/s MICON LABORATORIES (P) LTD,

Plot No.2,3 Gat No.52 Dhodi Shivar, Dhamane Post-Devbhane-424307

**Manufacturer Premises Address**

Plot No.2,3 Gat No.52 Dhodi Shivar, Dhamane, Post-Devbhane-424307 Tal Dist.Dhule(M.S)

Gat No 319, Nikumbhe Road, At Post Nimdale, Tal. Dhule, Maharashtra 424002

पत्रक विवरण

CIR-230573/2022-Thiamethoxam (WG) (442)-1199

थायामेथोक्साम 25 प्रतिशत डब्ल्यू जी  
( कीटनाशक)

थायामेथोक्साम 25 डब्ल्यू जी एक अंतःप्रवाही कीटनाशक है जो तीव्र उदरीय तथा सस्पर्शी क्रियाशीलता रखता है तथा इसकी सिफारिश धान की फसल पर लगने वाले तना छेदक, माजू मक्खी, पत्ता मोड़क, भूरा पत्ती टिड्डा, सफेद पौधा टिड्डा,हरा पत्ती टिड्डा, चुरदा, कपास में माहू , तेला, सफेद मक्खी, आम में टिड्डो, गेहूँ में माहू , बैंगन में सफेद मक्खी व तेला, सरसो में माहू, टमाटर में सफेद मक्खी, चाय में मच्छर कीट तथा आलू में माहू , नींबू में सिल्ला, भिन्डी में माहू व तेला, टमाटर (भूमि उपचार) में सफेद मक्खी, जीरा में एफिड, धान (नर्सरी) में धान का हरा पत्ती फुदका, चुरदा, एवं भरल मैगट की रोकथाम के लिए किया जाता हैं। इसमें उत्पादन के प्रति किलो (व/व) में 250 ग्राम थायामेथोक्साम सक्रिय तत्व के रूप में किया जाता है।

उपयोग

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों में)	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद ( घंटे)
		स. तत्व (ग्राम)	संरचना (ग्राम)			
बैंगन	सफेद मक्खी, तेला	50	200	500	3	
	सफेद मक्खी, तेला	50	200	500	3	
नींबू	सिल्ला	25	100	1000	20	
	सिल्ला	25	100	1000	20	
कपास	माहो, तेला	25	100	500-750	21	
	माहू , तेला	25	100	500-750	21	
	(पहली छिड़काव बुआई के 25-30 दिनों के बाद पहली बार कीटों के नजर आने पर और उसके बाद 2-3 छिड़काव 15 दिनों के अंतर से कीटों की मौजूदगी के आधार पर।					
	सफेद मक्खी	50	200	500-750	21	
	सफेद मक्खी	50	200	500-750	21	
जीरा	माहू	25	100	500	15	

फ़सल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनो मे)	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
		स. तत्व (ग्राम)	संरचना (ग्राम)			
	माहू	25	100	500	15	
पत्ते पर छिड़काव	(पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद 15 दिनो के अंतर से 1-2 छिड़काव कीटो की मौजूदगी के आधार पर।					
पत्ते पर छिड़काव	(पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद 10-15 दिनो के अंतर से 2-3 छिड़काव कीटो की मौजूदगी के आधार पर।					
	(पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद 10-15 दिनो के अंतर से 2-3 छिड़काव कीटो की मौजूदगी के आधार पर।					
आम	टिडडो	25	100	1000	30	
	टिड्डे	25	100	1000	30	
	(पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद 15 दिनो के अंतर से 1-2 छिड़काव कीटो की मौजूदगी के आधार पर।					
	टिडडे	25	100	1000	30	
सरसों	माहो	12.5-25.0	50-100	500-1000	21	
	माहू	12.5-25.0	50-100	500-1000	21	
	(पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद 15 दिनो के अंतर से 1-2 छिड़काव कीटो की मौजूदगी के आधार पर।					
	माहो, तेला	25	100	500-1000	5	

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनो मे)	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
		स. तत्व (ग्राम)	संरचना (ग्राम)			
भिंडी	(पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद 15 दिनो के अंतर से 1-2 छिड़काव कीटो की मौजूदगी के आधार पर।					
	माहू , तेला	25	100	500-1000	5	
	माहू, तेला	25	100	500-1000	5	
आलू	माहो	25	100	500	77	
	माहू	25 (पत्ते पर छिड़काव) 50 (मिट्टी को भिगोना)	100 (पत्ते पर छिड़काव) 200 (मिट्टी को भिगोना)	500	77	
धान	तना छेदक, माजू मक्खी, पत्ता मोड़क, भूरा पत्ती टिड्डा, सफेद पौधा टिड्डा, हरा पत्ती टिड्डा चुरदा					
	तना छेदक, माजू मक्खी, पत्ता मोड़क, भूरा पत्ती टिड्डा, सफेद पौधा टिड्डा, हरा पत्ती टिड्डा, चुरदा	25	100	500-750	14	
धान नर्सरी	धान का गॉल मिज	-	-	-	-	
	धान का हरा पत्ती फुदका, चुरदा, एवं भरल मैगट	500	2000	250 मि.ली./ग्राम	86	
धान मृदा उपचार (डरेंथ बनाकर)	धान का हरा फुदका, चुरदा	-	-	-	-	
मिट्टी को भिगोने की तारीख	माहो	50	200	400-500	77	
	कीटो के नजर आने से पहले, पौधो की जड़ की श्रेत्र को एक बार कीटनाशक से भिगो दें।					

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनो मे)	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
		स. तत्व (ग्राम)	संरचना (ग्राम)			
चाय	चाय का मच्छर कीट	25	100	400-500	7	
	चाय का मच्छर कीट	25	100	400-500	7	
	(पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद 10-15 दिनो के अंतर से 2-3 छिड़काव कीटो की मौजूदगी के आधार पर।					
टमाटर	सफेद मक्खी	50	200	500	5	
	सफेद मक्खी	50	200	500	5	
टमाटर (भूमि उपचार)	सफेद मक्खी	100	400	500	5	
गेहूँ	माहो	12.5	50	500	21	
	माहू	12.5	50	500	21	
	(पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद 15 दिनो के अंतर से 1-2 छिड़काव कीटो की मौजूदगी के आधार पर।					

### उपयोग के लिए दिशा-निर्देश

उत्पाद का लिखित मात्रा लीजिए उसे थोड़े पानी के साथ अच्छी तरह मिलाइए तथा किसी भी योग्य स्प्रेयर से पूरी फसल में कीजिए। निदिष्ट मात्रा का बाकी पानी भी अच्छी तरह से हिलाकर मिली लीजिए।

### प्रयोग का समय

1. आम- पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद 15 दिनो के अंतर से 1-2 छिड़काव कीटो की मौजूदगी के आधार पर। 2. आलू: पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद 10-15 दिनो के अंतर से 2-3 छिड़काव कीटो की मौजूदगी के आधार पर। भूमि उपचार- कीटो के नजर आने से पहले, पौधो की जड़ की श्रेत्र को एक बार कीटनाशक से भिगो दें। 3. कपास- पहली छिड़काव बुआई के 25-30 दिनो के बाद पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद 2-3 छिड़काव 15 दिनो के अंतर से कीटो की मौजूदगी के आधार पर। 4. गेहूँ- पहली

छिड़काव पहली बार कीटों के नजर आने पर और उसके बाद 15 दिनों के अंतर से 1-2 छिड़काव कीटों की मौजूदगी के आधार पर। 5. चाय- पहली छिड़काव पहली बार कीटों के नजर आने पर और उसके बाद 15-21 दिनों के अंतर से 2-3 छिड़काव कीटों की मौजूदगी के आधार पर। 6. टमाटर- पहली छिड़काव पहली बार कीटों के नजर आने पर और उसके बाद 10-15 दिनों के अंतर से 2-3 छिड़काव कीटों की मौजूदगी के आधार पर। भूमि उपचार - कीटों के नजर आने से पहले, पौधों की जड़ की श्रेष्ठ को एक बार कीटनाशक से भिगो दें। 7. धान: रोपाई के 25-30 दिनों के बाद एक छिड़काव फसल पर आने वाले धान के शुरुआती कीटों जैसे कि तना छेदक, माजू मक्खी आदि की रोकथाम के लिए, तत्पश्चात रोपाई के 50-55 दिनों के बाद दूसरा छिड़काव धान के फसल पर बाद की अवस्था पर आने वाले कीटों जैसे कि भूरा पत्ती टिड्डा, सफेद पौधा टिड्डा, हरा पत्ती टिड्डा, आदि की रोकथाम के लिए, कीटों की मौजूदगी के आधार पर। 8. बैंगन- पहली छिड़काव पहली बार कीटों के नजर आने पर और उसके बाद 10-15 दिनों के अंतर से 2-3 छिड़काव कीटों की मौजूदगी के आधार पर। 9. भिंडी- पत्ते पर छिड़काव- पहली छिड़काव पहली बार कीटों के नजर आने पर और उसके बाद 15 दिनों के अंतर से 1-2 छिड़काव कीटों की मौजूदगी के आधार पर। 10. सरसों- पहली छिड़काव पहली बार कीटों के नजर आने पर और उसके बाद 15 दिनों के अंतर से 1-2 छिड़काव कीटों की मौजूदगी के आधार पर। 11.नींबू: पहली छिड़काव पहली बार कीटों के नजर आने पर और उसके बाद 15-21 दिनों के अंतर से 2-3 छिड़काव कीटों की मौजूदगी के आधार पर।

### **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां**

1. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री, के खाली बर्तनों और पशुओं के चारे से दूर रखें ।
2. मुँह, आँखों, त्वचा को सम्पर्क से बचाये।
3. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचाये। हवा की दिशा में छिड़काव करे।
4. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं।
5. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए।
6. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहने।

### **विष के लक्षण**

विष के लक्षण से शरीर में ढीलापन, मिर्गी जैसे झटके और प्टोसिस हे सकते हैं।

### **प्राथमिक चिकित्सा**

1. यदि निगल जायें तो उल्टी न करायें या कोई पदार्थ मुँह द्वारा न दें।
2. यदि निगल जायें तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें
3. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाएं तो उनको उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं।
4. यदि आँखें दूषित हो जाएं तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग 10-15 तक धोएं।
5. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

## पौधविशाक्तता

### विष नाशक

कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है । लक्षणानुसार इलाज करें।

### खाली डिब्बों का निपटारा

1. पर्यावरण तथा पानी का प्रदूषण पचाने के लिए डिब्बे, बचा हुआ घोल/पदार्थ मशीनो की धोवन और खाली डिब्बो का निपटारा सुरक्षित स्थान पर करें।
2. पैकजो/डिब्बो को तोड़-मोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए ।
3. उपयोग किए गए पैकजो/डिब्बो को बाहर न छोड़े ताकि उनका दोबारा उपयोग न हो ।

### संग्रहण की शर्तें

1. कीटनाशक रखे हुए डिब्बों/पैकेजस को अलग कमरों या जगहों में उन कमरों या जगहों, जिनमें अन्य वस्तुएं रखी जाती हैं, उनसे दूर रखना चाहिए या अलग अलमारियों में ताला-चाबी लगाकर फंफूदनाशक की प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखें ।
2. जिस कमरे या अलमारी में फंफूदनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाशमय, हवादार तथा पर्याप्त आकार का होना चाहिए।

### रासायनिक संरचना

क्रमांक	घटक	विवरण	वजन
1	थायामेथोक्साम सक्रिय तत्व		25.00 % भार/भार
2	छितरानेवाले तत्व- सोडियम लिग्नोसलफोनेट		5.00 % भार/भार
3	गीले होने वाले तत्व सोडियम लॉरिल सल्फेट		3.75 % भार/भार
4	प्लास्टिसायजर ब्यूटीलेटेड पॉली विनाइल पायरोलिडॉन		1.25 % भार/भार
5	संवाहक डायएटोओमेशिअस मिट्टी		5.00 % भार/भार
6	बाईन्डर कॉर्न स्टार्च		पर्याप्त मात्रा % भार/भार
कुल			100 % w/w

### निर्माता

अंग्रेजी में लिखे अनुसार

### उत्पादन परिसर

अंग्रेजी में लिखे अनुसार