



®

MICON Z PLUS

CIR-53, 186/2006

Mancozeb 75% W.P.

Contact Fungicide

Instruction Leaflet

Manufactured By :
MICON LABORATORIES (P) LTD.

Factory : Gat No. 52, Dhodi Shivar,
Dhandane Road, Dhamane
Post - Deobhane 424307 Tal. Dist. Dhule (M.S.)

उत्पादक :
मायकॉन लॅबोरेटरीज प्रा.लि.
फॅक्टरी : गट नं. ५२, धोडी शिवार,
ढंढाणे रोड, धमाणे पो. देवभाने 424307
ता.जि. धुळे (महाराष्ट्र)

-: उत्पादक :-
मायकॉन लॅबोरेटरीज प्रा.लि.
इंक्वेटरी : गट नं. ५२, धोडी शिवार,
धमाणे पो. देवभाने-४२४३०७
ता.जि.धुलिया (महाराष्ट्र)

Regd. Office :
MICON LABORATORIES (P) LTD.

Factory : Gat No. 52, Dhodi Shivar,
Dhandane Road, Dhamane
Post - Deobhane 424307 Tal. Dist. Dhule (M.S.)

MICON Z PLUS

CIR-53,186 /2006

Mancozeb 75% W.P.

(Contact Fungicide)

It is a Co-ordination product of zinc & manganese ethylene bisdithiocarbamate and contact fungicide based on mancozeb Tech. containing 75% w/w active ingredient and balance advents.

Crop Recommendation Crop(S)	Common Name of Diseases (gm)	Dosages per hectare		Waiting Period to harvest (weeks)
		Formulation A.I. (gm%)	From last spray Dilution in Water (Ltr.)	
POTATO	LATE BLIGHT EARLY BELIGHT	1.25-1.5	1.5-2	750
TOMATO	LATE BLIGHT BUCK EYE ROT	1.125-1.5	1.5-2	750
WHEAT	LEAF SPOT BROWN & BLAC	1.25-1.5	1.5-2	750 75
MAIZE	LEAF BLIGHT, DOWNY MILDEW	1.125-1.5	1.5-2	750
PADDY	BLAST	1.125-1-1.5	1.5-2	750
JOWAR	LEAF SPOT	1.125-1.5	1.5-2	750
BANANA	TIP ROT, SIGATOKA LEAF SPOT,GIGAREND ROT,	1.125-1.5	1.5-2	1000
APPLE	SCAB & SOOTY BLOTECHÉ	22.5GMS/TREE	30GMS/TRE	10 LTR /TREE
GRAPES	ANGULARLAF SPOAT DOWNY MILDEW	1.125-1.5	1.5-2	750 750
GUAVA	ANTHROCONSE FRUIT ROT	1.125-1.5 15GMS	1.5-2 20GMS	750 10/TREE

Direction of Use

Mainly foliar spray and also soil drench. Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack sprayer ,compression knapsack battery sprayer , ASPEE-HTP power sprayer.

Precaution

CAUTION:- WHILE HANDLING THE FUNGICIDE WORKERS AND USER MUST WEAR FULL PROTECTIVE CLOTHING LIKE LONG SLEEVED SHIRTS ,LONG PANTS, CHEMICAL RESISTANT GLOVES,SHOES ,GOGGLES ,HAT AND MASK _

1. keep away from foodstuff empty foodstuff containers and animals food.
2. Avoid contact with, eyes and skin.
3. Avoid inhalation at the time of the application .
4. Wash thoroughly the contaminated cloths and parts of the body after application.
5. Do not smoke, drinks , eats and chew anything while spraying.
6. Wear full protective clothing while mixing and application .

Phytotoxicity

The Product is not phytotoxic when used as per field recommendation

Symptoms of Poisoning

Apathy myotonia,tremor,difficult breathing,myospasms may occur .

First Aid

- 1.If swallowed ,include vomiting by tickling the back of throat. Repeat it Until the vomitus is clear Do not include vomiting if the patient is unconscious .
- 2.If clothing and skin are contaminated ,remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water .
- 3.If eyes are contaminated , flush with plenty of saline /clean water for about 10 to 15 minutes
- 4.If inhaled ,remove the patient to fresh air.

Antidote

No Specific antidote is known , treat symptomatically.

Disposal of Used Container

- 1.It shall be the duty of manufacture formulators and operator to dispose package or surplus materials and washing from the machine and container shall be disposed off a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.
- 2.The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
- 3.Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions

1.THE PACKAGE CONTAINING THE FUNGICIDE SHALL BE STORED IN SEPARATE ROOMS OR PREMISES AWAY FROM THE ROOMS OF PREMISES USED FOR STORING OTHER ARTICLES PARTICULARLY ARTICLES OF FOOD OR SHALL BE KEPT IN SEPARATE ALMIRAHS UNDER LOCK AND KEY DEPENDING UPON THE QUANTITY AND NATURE OF THE FUNGICIDE .

2.THE ROOM OR PREMISES MEANT FOR STORING THE INSECTICIDE SHALL BE WELL BUILT, DRY, WELL LIT AND VENTILATION AND OF SUFFICIENT DIMENSION TO AVOID CONTAMINATION WITH WATER VAPOUR...

Liability Clause :

Recommendation for product usase are based on the latest level of expertise of the manufacture. Many factors such as weather and soil conditions, plants type, resistance, spraying techniques and other applications may influence the effect of the product. Since the use of this product is beyond our control we cannot assume any responsibility other than the uniform quality of the product. The Manufacturer warrants the quality of the product if acquired by the user in sealed, original packing
Not to be used on crops than specified on this Lable / Leaflet.

Chemical Composition :

Mancozeb technical (85% % w / w a.i.)	88.230	%	w / w
Suspending agent (Gum)	2.000	%	w / w
Dispersing Agent (Alkyl)	2.000	%	w / w
Naphthal Sulphonate Surface Active agent (Sodium salt of alkyl aryl sulphonate)	2.000	%	w / w
China Clay	5.770	%	w / w
TOTAL :	100.000	%	w / w

Manufactured By :

Micon Laboratories Pvt. Ltd.

Gat No.52 Plot 2,3 No.,Dhodi Shivar Tal. & Dist Dhule (M.S.)

मायकन झेड प्लस

मॅनकोझेब 75% WP

(स्पर्शजन्य फफुंदीनाशक)

यह जस्ता और मॅंगनीज इथिलीन बिस्थीथोकाबामेट का एक समन्वय उत्पाद है और मॅनकोझेब Tech.containing 75% w / w. आधारित कवकनाशक से संपर्क करे ।

उपयोग फसल के	रोग के सामान्य नाम	स तत्त्व	प्रती हेक्टर मात्रा संरचना	पानी	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल दिनों
आलु	आलु और टमाटर के पौधों में जल्दी से बेल्जियम	कि. ग्रा. 1.25-1.5	कि. ग्रा 1.5	750	
टमाटर	आलु और टमाटर के पौधों में बकवास आओ रोट एलआईएलएफ स्पॉट	1.125-1.5	1.5	750	
गेहूं	एलआईएलएफ स्पॉट भुरा काला	1.25-1.5	1.5	750	
मक्का	एलआईएलएफ BLIGHT कोमल फफुंदी	1.25-1.5	1.5	750	
धान	विस्फोट				
बदाम		1.25-1.5	1.5	750	
ज्वार	एलआईएलएफ स्पॉट	1.25-1.5	1.5	750	
केला	आईपी आरओटी सिगाटोका एलआईएलएफ स्पॉट GiGENDEND सदांध	1.25-1.5	1.5	1000	
सेब	एससीएबी और सोटी BLOTECH	22.5 जीएमएस / ट्री ३0 जीएमएस / टीआरई १0 लिटर / ट्री			
अंगूर	ANGULARLAF SPOAT कोमल फफुंदी ANTTTHRCONSE	1.25-1.5	1.5	750	
अमरुद	फल रोट	15 जीएमएस	20 जीएमएस	10 / वृक्ष	

उपयोग की दिशा :

मुख्य रूप से पत्तेदार स्त्रे और मिट्टी के खाई भी । Knaspack स्त्रेयर, पैर स्त्रेयर, संपीडन Knaspack बॅटरी स्त्रेयर, एएसपीईई-एचटीपी वावर स्त्रेयर ।

पहचानियात

सावधानी - जब फिंगरसाइड वर्कर्स और उपयोगकर्ता को पूरी तरह से संरक्षित कपड़े पहनना चाहिए । तो पूरी तरह से स्लीवेट शर्ट, लंबे पैंट, रासायनिक प्रतिरोधी ग्लोबल, जूते, गोगल्स, हेट और मास्क की तरह पूर्ण सुरक्षा कपड़े पहनना चाहिए ।

- खाद्य पदार्थों को खाली खाद्य पदार्थों के कंटेनर और जानवरों के भोजन से दूर रखें ।
- आंखों और त्वचा के संपर्क से बचें ।
- आवेदन के समय श्वास से बचें ।
- आवेदन के बाद पूरी तरह दुषित कपड़े और शरीर के हिस्सों को धो लें ।
- छिड़कते समय धुप्रपान न करें, पीएँ, खाएँ और चबाएँ ।
- मिश्रण और आवेदन करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें ।

phytoxicity

फील्ड अनुशंसा के अनुसार उत्पाद का उपयोग phytoxic नहीं है ।

जहदर के लक्षण

अपैथी मायोटोनिया, कंपकंपी, मुश्किल सांस लेने, मायोस्प्यासम हो सकते हैं ।

प्राथमिक चिकित्सा

- निगलने पर, गले के पीछे मुट्युदी करके उल्टी शामिल करें । इसे तब तक दोहराएँ जब तक उल्टी स्पष्ट न हो, रोगी बेहोश होने पर उल्टी शामिल न करें ।
- यदि कपड़ों और त्वचा दुषित हो जाते हैं, तो बलोज को हटा दें और प्रदुषित त्वचा को साबुन और पानी की भारी मात्रा में धो लें ।
- अगर आंखें दुषित हो जाती हैं, तो लगभग १0 से १५ मिनट तक नमकीन / साफ पानी के साथ फलश करें ।
- अगर श्वास लिया जाता है, तो रोगी को ताजा हवा में हटा दें ।

विषहर औपच

कोई एंटीडोट जात नहीं है, लक्षण का इलाज करें ।

प्रयुक्त कंटेनर का निपटान

- यह पैकेज या अतिशेष सामग्री का निपटान करने के लिए फॉर्मलेटर्स और ऑपरेटर का निर्माण करने का कर्तव्य होगा और मशीन और कंटेनर से धोने से पर्यावरण और पानी को रोकने के लिए एक सुरक्षित तरीके से निपटान किया जाएगा । प्रयुक्त
- प्रयुक्त पैकेजों को उनके पुनः उपयोग को रोकने के लिए बाहर नहीं छोड़ा जाएगा ।
- पैकेजों को तोड़ दिया जाएगा और निवास से दूर दफनया जाएगा ।

जमा करने के स्थितियाँ

- फंगसाइड युक्त पैकेज अलग-अलग कमरे रखा जाना चाहिए, या अन्य लेखों को विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के लेखों के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रस्तावों के कमरे से बाहर निकालना होगा लॉक के नीचे अलग-अलग अमिराहो में और कवक की मात्रा और कुंजी पर निर्भर होने के कारण महत्वपूर्ण होगा ।
- जलभंडार के लिए समझौते से बचने के लिए निषेध को रोकने के लिए कमरा या प्रस्ताव का उद्देश अच्यी तरह से तैयार किया जा सकता है, सूखा, अच्यी तरह से लेट और बॅटिलेशन और सहाय्यक डायमॅशन के लिए ।

जिम्मेदारी अरवीकार :

इस दवाई के उपयोग के तरीके उत्पादक के तत्कालीन प्रयोग पर आधारित है । कई बातें जैसे कि मौसम, भूमि का आकार, पौधे की आकार, उनकी विरोधात्मक शक्ति, छिड़काव विधि आदि दवाई के असर पर प्रभाव डाल सकती हैं ।

यदि इस उत्पादन के इस्तेमाल पर हमारा नियंत्रण नहीं है इसलिए उत्पादन में एकरूप गुणवत्ता कायम रखने की जिम्मेदारी के अतिरिक्त और कोई भी जिम्मेदारी स्वीकार करने में असमर्थ है । हमारी कीटनाशक दवा हमारी सीलबन्ड पैकिंग में खरीदने पर ही निर्माता की ओर से उसकी गुणवत्ता की गारंटी है ।

इस लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग मना है ।

रासायनिक रचना :

मॅनकोझेब तकनीकी	(85% वर w / w आधारित)	88.230 %	w / w
निलंबित एजंट (गम)		2.000 %	w / w
विच्छेदन एजंट (अल्किल)		2.000 %	w / w
नफटाल सल्फोनॉट			
भुतल सक्रिय एजंट (सोडियम अल्किल आर्य का नमक सल्फोनॉट)		2.000 %	w / w
चीनी मिट्टी		5.770 %	w / w
एकूण :		100.000 %	w / w

द्वारा निर्मित :

मायकन लेबोरेटरीज प्रा. लि.

गट नं. ५२, प्लॉट नं. २, ३ धोडी शिवार, धुळे

मॉयकन झेड प्लस

मॅनकोझेब 75% WP

(स्पर्शजन्य बुरशीनाशक)

हे जस्त आणि मॅगनीज इथिलीन बिस्थीथोकाबॅमेचे एक समन्वय उत्पादन
आणि मॅनकोझेब Tech.containing 75% w / w. सक्रिय घटक आणि
शिल्लक मदत यावर आधारित बुरशीनाशक संपर्क आहे.

शिफारस क्रॉप (एस) कीटक	सहकारी नाव	डोस प्रति हेक्टर ए आय (जीएम %)	सूत्रीकरण (ग्राम)	Dilution in पाणी (लिटर)	प्रतीक्षा करित आहे कालावधी अंतिम स्त्रे पासून कापणी (आठवडे)
बटाटे	दुपारी चमकदार सुरुवातीपासून दुपारी	1.25-1.5	1.5	750	
टोमॅटो	दुपारी चमकदार बलक आय राट लीफ स्पॉट	1.125-1.5	1.5	750	
गहू	लीफ स्पॉट	1.25-1.5	1.5	750	
	ब्राऊन आणि ब्लॅक	1.25-1.5	1.5	750	
मका	लीफ फाइट Downy Mildew	1.25-1.5	1.5	750	
भात	बदाम	1.25-1.5	1.5	750	
ज्वारी	लीफ स्पॉट	1.25-1.5	1.5	750	
बाना	TIP ROT सिंगाटोका LEAF SPOT, GiGENDEND रो	1.25-1.5	1.5	1000	
सफरचंद लिटर / ट्री	SCAB आणि SOOTYIP		22.5 जीएमएस / ट्री ३० जीएमएस / टीआरई १०		
द्राक्षे	BLOTECH ANGULARLAF SPOT	1.25-1.5	1.5	750	
	DOWNY MILDEW	1.25-1.5	1.5	750	
	अॅटथ्रॉनस	1.25-1.5	1.5	750	
पेरू	फ्रुट रोट	१५ जीएमएस	२० जीएमएस	१० / वृक्ष	

वापराचे दिशानिर्देश :

मुख्यतः पणसंबंधी स्त्रे आणि मुदा भट्टी, नॅपॅक स्प्रेयर, फ्रुट स्प्रेयर, कॉम्प्रेसन नप्सक स्प्रेयर,
फ्लेडर बॅटरी स्प्रेयर, एएसपीईई-एचटीपी पावर स्प्रेयर.

सावधानी -

सावधान - फंगुसीचे काम करणाऱ्या कामगारांना हाताळताना आणि बरेच लांब गळपट्टी शर्ट, लांब पॅन्ट,
रासायनिक प्रतिरोधी चट्टे, घोडा, गोल, हॅट, आणि मास्क सारख्या संपूर्ण संरक्षणशील कपडे वापरणे
आवश्यक आहे.

- अन्नपदार्थापासून मुक्त अन्न कंटेनर आणि प्राण्यापासून दूर रहा.
- संपर्कापासून डोळ्यापासून आणि त्वचेला टाळा.
- एप्लिकेशनच्या वेळेस इन्हेलेशन टाळा.
- उपचारानंतर दूषित कपडे आणि शरिराच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये धुवावे.
- फवारणी करताना धुम्रपान करू नका. पेय खाऊ नका, काहिही खाऊ नका.

फुटाटॉक्सिकिटी

फील्ड शिफारशीनुसार वापरताना हे उत्पादन फायटोटॉक्सिक नसते.

विषबाधाचे लक्षण

औदासिन्य म्युटोनिया, धरधरणे, अवघड श्वास, myospasms उदभू शकते.

प्रथमोपचार

- जर गिळाला तर घशाच्या मागच्या गुळगुळीत गुंठणे देऊन उलटीचा समावेश करा. तो पुन्हा पर्यंत
ओकून पडलेला पदार्थ उलट्या समावेश करू नका रूग्ण बेशुध्द आहे तर स्पष्ट
- जर कपडे आणि त्वचे दूषित झाल्यास, क्लो कोस काढा आणि दूषित प्रमाणात साबण
आणि पाण्याबरोबर धुवून घ्या.
- जर डोळे दूषित झाल्यास १० ते १५ मिनिटे भरपूर स्वच्छ पाण्यात मिसळा.
- श्वास घेतल्यास रूग्णाला ताजी हवेत काढा.

विषबाधेची उपचार :

विशेष विधान जात नाही. उपचारात्मक उपचार.

वापरलेल्या कंटेनरचे विट्हेवाट ठावणे

- हे पॅकेज किंवा अतिरिक्त सामग्रीचे विट्हेवाट लावण्याकरिता आणि मशीनमधून धुण्याची आणि
कंटेनरचा निपटारा करण्याच्या कारणास्तव नियामक आणि ऑपरेटरचे कर्तव्य असले जेणेकरून
पर्यावरणीय आणि जलप्रवाह रोखण्यासाठी ते सुरक्षित रितीने बाहेर काढले जातील.
- वापरलेले पॅकेज ते पुन्हा वापरण्यासाठी प्रतिबंधित केले जाणार नाहीत.
- पॅकेजेस घराबाहेरून तुरून फुटल्या जातील.

साठवण परिस्थिती :

- Fungicide असलेला पॅकेज भविष्यातील इतर खाद्यपदार्थाच्या साठवणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या
खोल्यापासून दूर असलेल्या खोल्यामध्ये किंवा फुलांच्या वरून अभ्यास केला जाईल. लोखंडी आवारात
आणि फंगिदाया गुणवत्तेवर मुख्य आधार देण्यामध्ये वेगवेगळे अल्मिरांतर्गत केप्लट होणार आहे.
- इन्सेक्टिसास साठवण्याकरिता आवश्यक असलेली खोली किंवा दगडी पाणथळ जागांच्या
वातावरणात टाळण्यासाठी चांगले, स्वच्छ तसेच लिफ्ट आणि वेनिलायन्स आणि दुर्मिळ व्यासाचा असेल.

जबाबदारी नियम :

हे औषध वापरण्याची पध्दत हि कंपनीच्या तत्कालीन प्रयोगावर आधारित आहे. अनेक बाबी उदा. वातावरण,
जमिनीचा प्रकार, पिकाचा प्रकार, फवारणी पध्दत इत्यादी गोष्टींचा कितकनाशकाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम
होऊ शकतो म्हणून या कितकनाशकाचा वापर कंपनीच्या नियंत्रणाबाहेर आहे. या उत्पादनांच्या एकसमान
गुणवत्तेच्या खात्रीशिवाय इतर कोणतीही जबाबदारी कंपनी घेत नाही. आमचे कितकनाशक हे सिलबंद
पॅकेजमध्ये खरेदी केल्यानंतर कंपनी त्याच्या गुणवत्तेची गॅरंटी देते.
हे दस्तपत्रक घर निर्दिष्ट केलेल्या व्यतिरिक्त इतर पिके वापरता येणार नाही

रासायनिक रचना :

मॅनकोझेब तांत्रिक	(85% वर w / w आधारित)	80.400 %	w / w
निलंबित एजंट (गोंद)		2.000 %	w / w
डिस्प्रेसिंग एजंट (अल्किल)		2.000 %	w / w
नेफाईल सल्फोनेट			
पृष्ठभाग सक्रिय एजंट (सोडियम अल्कली एरिलचे मीठ सल्फोनेट		2.000 %	w / w
चीन चिकणमाती		5.770 %	w / w
एकूण :		100.000 %	w / w

द्वारा निर्मित :

मॉयकन लेबोरेटरीज प्रा. लि.

गट नं. ५२, प्लॉट नं. २, ३ धोडी शिवार, धुळे

માઇકોન ઝેડ પ્લસ

સીઆઈઆર -53,186 / 2006
માન્કોઝેબ 75% ડબલ્યુ.પી.

(સંપર્ક ફૂગનાશક)

તે ઝિંક અને મેંગેનીઝ ઇથિલિનનું સંકલન ઉત્પાદન છે
bisdithiocarbamate અને સંપર્ક ફૂગનાશક આધારે
મેનકોઝેબ ટેક.કોન્ટેનિંગ 75% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ સક્રિય ઘટક અને સંતુલન એડવેન્ટસ.

પાક ભલામણ

પાક (1)ડોક્ટરનુંસામાન્ય નામપ્રતિ રોગો	હેક્ટરપ્રતીકામાં એ.આઈ.ની (ગ્રામ)%	અવધિમાં ફોર્મ્યુલેશન વોટર (લિટર.)	અવધિમાં ફોર્મ્યુલેશન વોટર (લિટર.) છેલ્લા સ્પ્રેથી (જીએમ) પાક (અઠવાડિયા)	
પોટોટો	અંતમાં પ્રકાશ પ્રારંભિક વિશ્વાસ	1.25-1.5	1.5-2	750
ટોમેટો	અંતમાં પ્રકાશ બક આઇ આઇ રોટ લેફ સ્પોટ	1.125-1.5	1.5-2	750
WHEAT બ્રાઉનઅને મેઇઝ	Leaf SPOT બીએલએસી લેફ બ્લાઇટ, ડાઉન મિલ્ડવ પેડિ બ્લાસ્ટ	1.25-1.5	1.5-2	750
જુવાર બનાના	લેફ સ્પોટ ટીપ રોટ, સિગટોકા લેફ સ્પોટ, ગિગેન્ડ રોટ,	1.125-1.5	1.5-2	1000
સફરજન	સ્કેબ અને સૂટી નિખારવું અંગૂઠો સ્પોટ ડાઉન મિલ્ડવ	22.5GMS / TREE	30GMS / TRE	10 LTR / TREE
એન્ટીકાન્સ ગુવા	1.125-1.5 ફળ ફળ રોટ	1.5-2	750	750
	15 જીએમએસ	20 જીએમએસ	10 / ટ્રી	

ઉપયોગની દિશા

મુખ્યત્વે પશિયાળ સ્પ્રે અને માટીનો ખાસી. નાપ્સાકક સ્પ્રેઅર, ફુટ સ્પ્રેઅર, કમ્પ્રેશન નાપ્સાકક સ્પ્રેઅર, કમ્પ્રેશન નેપ્સાકક બેટરી સ્પ્રેઅર, ASPEE-HTP પાવર સ્પ્રેઅર.

સાવચેતી

સાવધાન: - જ્યારે મનોરંજક કામદારો અને વપરાશકર્તાને નિયંત્રિત કરવું જોઈએ પહેરો સંપૂર્ણ રક્ષણાત્મક કપડાની જેમ લાંબી સ્લીવ્સ શર્ટ્સ, લાંબા પેન્ટ્સ, રાસાયણિક પ્રતિનિધિ ગ્લોવ્સ, શૂઝ, ગોગલ્સ, હેટ અને માસ્ક

1. ખાદ્યપદાર્થો ખાવી ખાદ્યપદાર્થો અને પ્રાણીઓના ખોરાકથી દૂર રાખો.
2. આંખો અને ત્વચા સાથે સંપર્ક ટાળો.
3. એલિલકેશન સમયે શ્વાસ લેવાનું ટાળો.
4. અરજી કર્યા પછી દૂષિત કપડા અને શરીરના ભાગોને સારી રીતે ધોઈ લો.
5. ધૂમ્રપાન કરતી વખતે ધૂમ્રપાન કરશો નહીં, પીશે, ખાશે અને ચાવશે.
6. મિશ્રણ અને એલિલકેશન કરતી વખતે સંપૂર્ણ રક્ષણાત્મક કપડાં પહેરો.

ફાયટોટોક્સિસીટી

જ્યારે ઉત્પાદનની ભલામણ મુજબ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ ફાયટોટોક્સિક નથી

ઝેરના લક્ષણો

ઉદાસીનતા મ્યોટોનિયા, કંપન, મુશ્કેલ શ્વાસ, મ્યોસ્પેઝ્મસ થઈ શકે છે.

પ્રાથમિક સારવાર

1. જો ગળી જાય, તો ગળાના પાછલા ભાગમાં ગલીપચી કરીને ઓલટી શામેલ કરો. પુનરાવર્તન કરો તે ઉપરાંત સ્પષ્ટ થાય ત્યાં સુધી જો દર્દી બેભાન હોય તો વ્હટીનો સમાવેશ કરશો નહીં.
2. જો કપડાં અને ત્વચા દૂષિત છે, તો કપડાં કા remove ને ધોઈ લો દૂષિત ત્વચા સાબુ અને પાણીની વિપુલ માત્રામાં.
3. જો આંખો દૂષિત છે, તો લગભગ 10 થી 15 મિનિટ સુધી પુષ્કળ ખારા / શુદ્ધ પાણીથી ફ્લશા. જો શ્વાસ લેવામાં આવે તો દર્દીને તાજી હવામાં દૂર કરો.

મારણ

કોઈ વિશિષ્ટ મારણ જાણીતું નથી, રોગનિવારક સારવાર કરો.

વપરાયેલ કન્ટેનરની નિકાલ

1. પેકેજ અથવા સરખસનો નિકાલ કરવો તે ઉત્પાદન સૂત્રો અને operator પરેટરની ફરજ રહેશે મશીન અને કન્ટેનરમાંથી સામગ્રી અને વ washing શિંગનો નિકાલ સલામત રીતે કરવામાં આવશે જેથી પર્યાવરણીય અને જળ પોલ્યુશનને અટકાવી શકાય.
2. ઉપયોગમાં લેવાતા પેકેજો તેમના ફરીથી ઉપયોગને અટકાવવા માટે બહાર છોડી શકાશે નહીં. Pack. પેકેજો તૂટી જશે અને આવાસથી દૂર દફનાવવામાં આવશે.

સોરેજ શરતો

1. પેકેજ કન્ટેન્ટિંગ ફ ફન્ગીસાઇડ અલગ સ્ટોર કરવામાં આવશે સ્ટોરિંગ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી પ્રેમાસીસની રુમ્સમાંથી હંમેશાં રુમ્સ અથવા અલેજીઓ ખાદ્યપદાર્થોની ખાસ લેખ અથવા આર્ટિકલ્સ તેમાં રાખવામાં આવશે લોક હેઠળ અમીરાહને અલગ કરો અને તેના ઉપર આધારિત મનોરંજક ગુણવત્તા અને પ્રકૃતિ.
2. ઇન્સેક્ટીસાઇડ સ્ટોર કરવા માટેનો ઓરડો અથવા પ્રીમિસિસનો અર્થ વેલ બિલ્ડ, ડ્રાય, લિટ અને વેન્ટિલેશન અને હોઇ શકે છે પાણીની વરાળથી નિયંત્રણમાં રહેવા માટેનો સુસંગત સમય ...

જવાબદારી કલમ:

ઉત્પાદન વપરાશ માટે ભલામણ એ નવીનતમ સ્તરની કૃશળતા પર આધારિત છે ઉત્પાદન. હવામાન અને માટીની સ્થિતિ તરીકે ઘણા પરિબળો સુચા છે. ઇન્ડોનો પ્રકાર, પ્રતિકાર, છટકાવની તકનીકીઓ અને અન્ય એલિલકેશનો પ્રભાવિત થઈ શકે છે ઉત્પાદનની અસર. કારણ કે આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ અમારા નિયંત્રણથી બહાર છે અમે એક સમાન ગુણવત્તા સિવાયની કોઈ પણ જવાબદારી માની શકીએ નહીં ઉત્પાદન. જો ઉત્પાદક દ્વારા ઉત્પાદિત કરવામાં આવે તો ઉત્પાદકની ગુણવત્તાની બાંધપટ્ટી આપે છે સીલ માં વપરાશકર્તા. મૂળ પેકિંગ આ લેબલ / પત્રિકામાં ઉલ્લેખિત કરતા પાક પર ઉપયોગ ન કરવો.

રાસાયણિક રચના:

માન્કોઝેબ તકનીકી (85% w / w a.i.)	88.230	%	ડબલ્યુ / ડબલ્યુ
સુસ્પેન્ડિંગ એજન્ટ (ગમ)	2.000	%	ડબલ્યુ / ડબલ્યુ
વિપ્રેરનાર એજન્ટ (અલ્કલ)	2.000	%	ડબલ્યુ / ડબલ્યુ
નેથ્યલ સલ્ફોનેટ			
સપાટી સક્રિય એજન્ટ (સોડિયમ એલ્કલ એરિયલનું મીઠું સલ્ફોનેટ)	2.000	%	ડબલ્યુ / ડબલ્યુ
યાઇના કલે	5.770	%	ડબલ્યુ / ડબલ્યુ
કુલ :	100.000	%	ડબલ્યુ / ડબલ્યુ

દ્વારા ઉત્પાદિત:

માઇકન લેબોરેટરીઝ પ્રા. લિ.

ગેટ નં .52 પ્લોટ નં. 2,3, ધોડી શિવર એટ એન્ડ જિ.ધૂલે (એમ.એસ.)

மைக்கான் இசட் பிளஸ்

சி.ஐ.ஆர் -53,186 / 2006

மான்கோசெப் 75% டபிள்யூ.பி.

பூஞ்சைக் கொல்லியைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

இது துத்தநாகம் & மாங்கனீசு எத்தினின் ஒருங்கிணைப்பு தயாரிப்பு ஆகும். பிளாட்டினோகார்ப்டோம் மற்றும் தொடர்பு பூஞ்சைக் கொல்லியை அடிப்படையாகக் கொண்டது. mancozeb Tech. content 75% w / w செயலில் உள்ள மூலப்பொருள் மற்றும் சமநிலை வரகைகள்.

பயிர் பரிந்துரை	பயிர் (எஸ்)	காத்திருக்கும் நொய்கள் (gm)	காலத்திற்கு உருவாக்கம் உருவாக்கம் A.I. (gm%)	பொதுவான கடைசி தெளிப்பிலிருந்து அறுவடைக்கு நீர் (ltr)	அளவுகள் நிர்த்தல் (வாரங்கள்)
பொட்டாடோ	லேட் ப்ளேட்		1.25-1.5	1.5-2	750
டொமடோ	ஆரம்பகால நம்பிக்கை லேட் ப்ளேட்		1.125-1.5	1.5-2	750
WHEAT	பக் ஐ ரோட் லீஃப் ஸ்பாட்				
	LEAF SPOT		1.25-1.5	1.5-2	750
	BROWN & BLAC		1.125-1.5	1.5-2	750
MAIZE	LEAF BLIGHT, டவுனி மில்ட்		1.125-1.5	1.5-2	750
நெல்	பிளாஸ்ட்		1.125-1.5	1.5-2	750
JOWAR	LEAF SPOT		1.125-1.5	1.125-1.5	1.5-2 750
பனானா	டிப் ரோட், சிகடோகா லீஃப் ஸ்பாட், GIGAREND அழுக்கல்		1.125-1.5	1.5-2	1000
ஆப்பிள் ஸ்கேப் & குட்டி	22.5 ஜிஎம்எஸ் / ட்ரீ 30 ஜிஎம்எஸ் / ட்ரீ 10 எல்டிஆர் / ட்ரீ				
திராட்சை	BLOTECHE ANGULARLAF SPOAT		1.125-1.5	1.5-2	750
	DOWNY MILDEW		1.125-1.5	1.5-2	750
	ANTTHRONSE		1.125-1.5	1.5-2	750
குவாவா	ஃப்ரூட் ரோட்		15 ஜிஎம்எஸ்	20 ஜிஎம்எஸ்	10 / ட்ரீ

பயன்பாட்டின் திசை

முக்கியமாக ஃபோலியார் ஸ்ப்ரே மற்றும் மண் நனை, நாப்சாக் தெளிப்பான், கால் தெளிப்பான், சுருக்க நாப்சாக் தெளிப்பான், சுருக்க நாப்சாக் டேப்டரி தெளிப்பான், ASPEE-HTP பவர் ஸ்ப்ரேயர்.

முன்னெச்சரிக்கையாக

எச்சரிக்கை: - ஃபங்கிசைட் தொழிலாளர்களைக் கையாளும் போது மற்றும் பயனர் இருக்க வேண்டும் நீண்ட ஸ்லீவ் வுர்ட்ஸ், நீண்ட பேண்ட்ஸ் போன்ற முழு பாதுகாப்பு உடையையும் அணியுங்கள். வேதியியல் ரெசிஸ்டன்ட் க்ளோவ்ஸ், ஷூக்கள், கண்ணாடிகள், தொப்பி மற்றும் முகமூடி.

- வெற்று உணவுப்பொருட்களின் கொள்கலன்கள் மற்றும் விலங்குகளின் உணவில் இருந்து விலகி இருங்கள்.
- கண்கள் மற்றும் தோலுடன் தொடர்பு கொள்வதைத் தவிர்க்கவும்.
- பயன்பாட்டின் நேரத்தில் உள்ளிழுப்பதைத் தவிர்க்கவும்.
- பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு அசுத்தமான துணிகளையும் உடலின் பாகங்களையும் நன்கு கழுவங்கள்.
- தெளிக்கும் போது எதையும் புகைக்கவோ, குடிக்கவோ, சாப்பிடவோ, மெல்லவோ கூடாது.
- கலவை மற்றும் பயன்பாடு போது முழு பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணியுங்கள்.

பைட்டோடாக்ஸிட்

புலம் பரிந்துரையின் படி பயன்படுத்தும்போது தயாரிப்பு பைட்டோடாக்ஸிட்

அல்ல விஷத்தின் அறிகுறிகள்

அக்கறையின்மை மயோட்டோனியா, நடுக்கம், கடினமான சுவாசம், மயோஸ்பாஸ்கள் ஏற்படலாம்.

முதல்தவி

- விழுங்கினால், தொண்டையின் பின்புறத்தில் கூசுவதன் மூலம் வாந்தியை உள்ளடக்குங்கள். மீண்டும் மீண்டும் வாந்தியெடுக்கும் வரை நோயாளி மயக்கமடைந்தால் வாந்தியை சேர்க்க வேண்டாம்.
- ஆடை மற்றும் தோல் மாசுபட்டால், துணிகளை அகற்றி கழுவ வேண்டும் ஏராளமான சோப்பு மற்றும் தண்ணீருடன் அசுத்தமான தோல்.
- கண்கள் மாசுபட்டால், சுமார் 10 முதல் 15 நிமிடங்கள் வரை ஏராளமான உப்பு / சுத்தமான தண்ணீரில் பறிக்கவும்.
- உள்ளிழுத்தால், நோயாளியை புதிய காற்றுக்கு அகற்றவும். மாற்று மருந்தாக குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து எதுவும் தெரியவில்லை, அறிகுறியாக சிகிச்சையளிக்கவும்.

பயன்படுத்திய கொள்கலனை அகற்றுவது

- ஃபங்கிசைடத் தொடரும் தொகுப்பு தனித்தனியாக சேமிக்கப்படும் சேமிப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் பிரீமியஸின் அறைகளிலிருந்து அறைகள் அல்லது முன்பதிவுகள் மற்ற கட்டுரைகள் உணவின் குறிப்பிட்ட கட்டுரைகள் அல்லது தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் பூட்டுக்கு அடியில் அல்லிராக்களைப் பிரிக்கவும், மேலும் அவற்றைத் தடுக்கவும் FUNGICIDE இன் அளவு மற்றும் இயல்பு.
- அறையைச் சேமிப்பதற்கான அறை அல்லது முன்மாதிரிகள் வெல்ட் பில்ட், உலர், வெல் லிட் மற்றும் வென்டிவேஷன் மற்றும் ஆஃப் ஆசு இருக்க வேண்டும் நீர் நீராவிபுடன் தொடர்பு கொள்வதைத் தவிர்ப்பதற்கான போதுமான அளவு ...

பொறுப்பு விதி:

தயாரிப்பு பயன்பாட்டிற்கான பரிந்துரை சமீபத்திய நிலை நிபுணத்துவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது உற்பத்தி. பல காரணிகள் வானிலை மற்றும் மண்ணின் நிலைமைகளாக ச்ச்சா. தாவரங்களின் வகை, எதிர்ப்பு, தெளித்தல் நுட்பங்கள் மற்றும் பிற பயன்பாடுகள் பாதிக்கலாம் தயாரிப்பு விளைவு. இந்த தயாரிப்பின் பயன்பாடு எங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்டது என்பதால் ஓரே மாதிரியான தரத்தைத் தவிர வேறு எந்தப் பொறுப்பையும் எங்களால் ஏற்க முடியாது தயாரிப்பு. கையகப்படுத்தினால் உற்பத்தியாளர் தரத்தின் தரத்தை உத்தரவாதம் செய்கிறார் பயனர் சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அசல் பொதி இந்த லேபிள் / துண்டுப்பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை விட பயிர்களில் பயன்படுத்தக்கூடாது.

வேதியியல் கலவை:

மான்கோசெப் தொழில்நுட்பம் (85 % w / w a.i.)	88.230	%	w / w
இடைநீக்கம் செய்யும் முகவர் (கம்)	2.000	%	w / w
சிதறல் முகவர் (அல்கைல்)	2.000	%	w / w
நாபுதால் சல்போனேட்			
மேற்பரப்பு செயலில் உள்ள முகவர் (சோடியம் அல்கைல் அரில் உப்பு sulphonate)	2.000	%	w / w
சீனா களிமண்	5.770	%	w / w
மொத்தம் :	100.000	%	w / w

தயாரித்தவர்:

மைக்கான் லேபரேட்டர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் லிமிடெட்

கேட் எண் 52 சதி 2,3 எண், தோதி சிவர் தால் & மாவட்ட துலே (எம்.எஸ்.)

ಮೈಕಾನ್ Z ಡ್ ಪ್ಲಸ್

ಸಿಬಿಆರ್ -53,186 / 2006

ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 75% ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ.

(ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ)

ಇದು ಸತು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಎಫಿಲೀನನ ಸಮನ್ವಯ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ
ಬಿಸ್ಪಿಥಿಯೊಕಾರ್ಬಮೇಟ್ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ
mancozeb Tech.conting 75% w / w ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಆಗಮನ

ಬೆಳೆ ಶಿಫಾರಸು ಬೆಳೆ (ಎಸ್)	ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ರೋಗಗಳು (gm)	ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸಿಂಪಡಣೆಯಿಂದ ಎ.ಐ. (gm%)	ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ಸೂತ್ರೀಕರಣದ ಹೆಸರು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ನೀರು (Ltr.) (ವಾರಗಳು)
ಪೊಟಾಟೊ	ಲೇಟ್ ಬ್ಲೈಟ್ ಹಿಂದಿನ ನಂಬಿಕೆ	1.25-1.5	1.5-2 750
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬಕ್	ಲೇಟ್ ಬ್ಲೈಟ್ ಐ ರಾಟ್ ಲೀಫ್ ಸ್ಪಾಟ್	1.125-1.5	1.5-2 750
WHEAT	LEAF SPOT BROWN & BLAC	1.25-1.5 1.125-1.5	1.5-2 750 750
MAIZE	LEAF BLIGHT, ಡೌನಿ ಮಿಲಿಯೂಸ್	1.125-1.5 1.125-1-1.5	1.5-2 750 750
ಜೋವರ್	ಲೀಫ್ ಸ್ಪಾಟ್	1.125-1.5	1.5-2 750
ಬನಾನಾ	ಟೀಪ್ ರಾಟ್, ಸಿಗಾಟೊಕಾ ಲೀಫ್ ಸ್ಪಾಟ್, ಗಿಗರಂಡ್ ROT,	1.125-1.5	1.5-2 1000
ಆಪಲ್ ಸ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ಸೂಟಿ	22.5 ಜಿಎಂಎಸ್ / ಟ್ರೀ 30 ಜಿಎಂಎಸ್ / ಟೀ ಆರ್ 10 ಎಲ್ಝಿಆರ್ / ಟ್ರೀ		
BLOTECH			
ಗಾಂಜ್	ಅಂಗುಲಾರ್ಲಾಫ್ SPOAT	1.125-1.5	1.5-2 750
ಡೌನಿ	ಮಿಲಿಯೂಸ್ ANTTHRCONSE	1.125-1.5 1.125-1.5	1.5-2 750 750
ಗುವಾ	ಫೂಟ್ ರಾಟ್	15 ಜಿಎಂಎಸ್	20 ಜಿಎಂಎಸ್ 10 / ಟ್ರೀ

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವ-ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆ, ಕಾಲು ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆ, ಕಂಪೌನ್ಡ್ ನಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪೌನ್ಡ್ ನಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ASPEE-HTP ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್.

ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: - ಕಾರ್ಯನಿರತ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಾಗ ಉದ್ದವಾದ ಸ್ವೀವ್ ಶರ್ಟ್‌ಗಳು, ಉದ್ದವಾದ ಪ್ಯಾಂಟ್‌ಗಳು, ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿರೋಧಕ ಗ್ಲೋವ್ಸ್, ಪೂಗುಳು, ಕನ್ನಡಕಗಳು, ಟೋಪಿ ಮತ್ತು ಮುಖವಾಡ.

1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
2. ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
3. ಅಪ್ಪಿಕೇಶನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಲೇಷನ್ ತಪ್ಪಿಸಿ.
4. ಅನ್ವಯಿಸಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
5. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ, ಪಾನೀಯ, ತಿನ್ನಲು ಮತ್ತು ಅಗಿಯಬೇಡಿ.
6. ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ.

ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ

ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಬಳಸಿದಾಗ ಉತ್ಪನ್ನವು ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಮಯೋಟೋನಿಯಾ, ನಡುಕ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಮೈಯೋಸ್ಟಾಸ್ಮ್, ಸಂಧವಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

1. ನುಂಗಿದರೆ, ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಾಂತಿ ಸೇರಿಸಿ. ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿ ವಾಂತಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗುವವರೆಗೆ ರೋಗಿಯು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿದ್ದರೆ ವಾಂತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಡಿ.
2. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ತೊಳೆಯಿರಿ ಕಲುಷಿತ ಚರ್ಮವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ.
3. ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಲವಣಯುಕ್ತ / ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಹರಿಯಿರಿ.
4. ಉಸಿರಾಡಿದರೆ, ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.

ಪ್ರತಿವಿಷ

ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ರೋಗಲಕ್ಷಣದಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.

ಬಳಸಿದ ಕಂಟೇನರ್ ವಿಲೇವಾರಿ

1. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಮತ್ತು ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು.
2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರು ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು.
3. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊಳಬೇಕು.

ಸೂರೇಜ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

1. ಫಂಗಿಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪೂರ್ವಭಾವಿಗಳ ಕೊಠಡಿಗಳಿಂದ ರೂಮ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಪೂರ್ವನಿಗದಿಗಳು ಇತರ ಲೇಖನಗಳು ಆಹಾರದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲೇಖನಗಳು ಅಥವಾ ಇರಲಿ ಲಾಕ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಿಠಾಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಫಂಗಿಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವ.
2. ರೂಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೀಮಿಸ್ ಇನ್‌ಕ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅರ್ಥ ಉತ್ತಮ ಬಿಲ್ಡ್, ಡ್ರೈ, ವೆಲ್ ಲಿಟ್ ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನೀರಿನ ಆವಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ.

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಷರತ್ತು:

ಉತ್ಪನ್ನ ಬಳಕೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಸಸ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿರೋಧ, ಸಿಂಪಡಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಳಕೆ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮೀರಿರುವುದರಿಂದ ಏಕರೂಪದ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉತ್ಪನ್ನ ವಾರಂಟ್‌ಗಳ ತಯಾರಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಈ ಲೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ ತಾಂತ್ರಿಕ (85 % w / w a.i.)	88.230 %	w / w
ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆಂಟ್ (ಗಮ್)	2.000 %	w / w
ಚೆದುರಿಸುವ ಏಜೆಂಟ್ (ಆಲ್ಕೈಲ್)	2.000 %	w / w
ನಾಫ್ಥಾಲ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಕ್ರಿಯ ಏಜೆಂಟ್ (ಸೋಡಿಯಂ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆರಿಲ್ ಉಪ್ಪು ಸಲ್ಫೋನೇಟ್)	2.000 %	w / w
ಚೀನಾ ಕ್ಷೇ	5.770 %	w / w
ಒಟ್ಟು:	100.000 %	w / w

ಇವರಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ:

ಮೈಕಾನ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರೀಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್.

ಗ್ಯಾಟ್ ನಂ. 52 ಫಾಟ್ 2,3 ನಂ, ಧೋಡಿ ಶಿವಾರ್ ತಾಲ್. & ಡಿಸ್ಟ್ ಧುಲೆ (ಎಂ.ಎಸ್.)